

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර(උසස් පෙළ),2012 අගෝස්තු

සංයුක්ත ගණිතය I

පැය තුනයි.

B කොටස

11)(a).  $f(x) = x^2 + 2kx + k + 2$  යැයි ගනිමු. මෙහි  $k$  යනු තාත්වික නියතයකි.

I.  $f(x)$  යන්න  $(x - a)^2 + b$  ආකාරයෙන් ප්‍රකාශ කරන්න. මෙහි  $a$  හා  $b$  යනු  $k$  ඇසුරෙන් නිර්ණය කළ යුතු නියත වේ.

කලනය භාවිතයෙන් තොරව ,  $f(x)$  හි හැරුම් ලක්ෂ්‍යය සොයා මෙම ලක්ෂ්‍යය අවමයක් බව පෙන්වන්න.

$f(x)$  හි අවම අගය  $k$  ඇසුරෙන් සොයන්න.

එනමින්,  $y = f(x)$  වක්‍රය,

- i.  $-1 < k < 2$  නම්,  $x$ -අක්ෂයට ඉහළින් මුළුමනින්ම පිහිටි බව,
- ii.  $k = -1$  හෝ  $k = 2$  නම්,  $x$ -අක්ෂය ස්පර්ශ අරන බව,
- iii.  $k < -1$  හෝ  $k > 2$  හෝ නම්,  $x$ -අක්ෂය ප්‍රහින්න ලක්ෂ්‍ය දෙකකදී කපන බව පෙන්වන්න.

II.  $k < -2$  ම නම් පමණක්  $m$  හි සියලු තාත්වික හා පරිමිත අගයන් සඳහා  $y = mx$  සරල රේඛාව  $y = f(x)$  වක්‍රය තාත්වික හා ප්‍රහින්න ලක්ෂ්‍ය දෙකකදී ඡේදනය කරන බව පෙන්වන්න.

(b).  $g(x) \equiv x^4 + 4x^3 + 7x^2 + 6x + 2$  යැයි ගනිමු.

ශේෂ ප්‍රමේයය නැවත නැවත යොදා ගනිමින්  $(x + 1)^2$  යන්න  $g(x)$  හි සාධකයක් බව පෙන්වන්න.

$g(x)$  යන්න  $(x - a)^2(x^2 + bx + c)$  ආකාරයෙන් ප්‍රකාශ කරන්න. මෙහි  $a, b$  හා  $c$  නිර්ණය කළ යුතු නියත වේ.

$x$  හි සියලු තාත්වික අගයන් සඳහා  $g(x) \geq 0$  බව අපෝහනය කරන්න.

12)(a). සියලු  $x \in \mathbb{R}$  සඳහා  $12x^2 + 1 \equiv A(2x - 1)^3 + B(2x + 1)^3$  වන පරිදි  $A$  හා  $B$  නියත සොයන්න.

එනමින්  $r \in \mathbb{Z}^+$  සඳහා  $u_r = f(r) - f(r + 1)$ , වන පරිදි  $f(r)$  නිර්ණය කරන්න

; මෙහි  $u_r = \frac{12r^2 + 1}{(2r-1)^3(2r+1)^3}$  වේ.

$\sum_{r=1}^n u_r = \frac{1}{2} - \frac{1}{2(2n+1)^3}$  බව පෙන්වන්න.

$\sum_{r=1}^{\infty} u_r$  ශ්‍රේණිය අභිසාරී බව පෙන්වා,  $\sum_{r=1}^{\infty} u_r$  හි අගය සොයන්න.

(b). එකම රූපයක,  $y = |2x - 1|$  හා  $y = |x| + \frac{5}{3}$  හි ප්‍රස්ථාරවල දළ සටහන් අඳින්න.

එ නමින්,  $3|x| \geq |6x - 3| - 5$  සඳහා වන  $x$  හි අගය කුලකය සොයන්න.

ඕනෑම  $k \in \mathbb{R}$  සඳහා  $y = |x| - k$  හි ප්‍රස්ථාරය එකම රූපයේ සලකමින්,  $l$  හි කවර අගයක් සඳහා  $3|x| = |6x - 3| + l$  සමීකරණයට තාත්වික විසඳුම් එකක් පමණක් තිබේ දැයි සොයන්න.

13)(a).  $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$  යනු  $2 \times 2$  න්‍යාසයක් යැයි ගනිමු.

$A^2 - 3A + 2I = 0$  බව පෙන්වන්න; මෙහි  $I$  යනු  $2 \times 2$  ඒකක න්‍යාසය හා  $O$  යනු  $2 \times 2$  ශුන්‍ය න්‍යාසය වේ. ඒ නමින්,  $A^{-1}$  සොයන්න.

$B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$  යනු  $2 \times 2$  න්‍යාසයක් යැයි ගනිමු.

$BA = B$  බව පෙන්වන්න.

ඒ නමින් හෝ වෙනත් අයුරකින්,  $BC = 0$  වන පරිදි  $c$  නම් න්ශ්ශුන්‍ය  $2 \times 2$  න්‍යාසයක් සොයන්න.

(b).  $Z$  යනු සංකීරණ සංඛ්‍යාවක් යැයි ගනිමු.

$|Z|^2 = Z\bar{Z}$  හා  $|Z| \geq \text{Re}Z$  බව සාධනය කරන්න.

එ නමින්,

ඕනෑම  $Z_1$  හා  $Z_2$  සංකීරණ සංඛ්‍යා දෙකක් සඳහා  $|Z_1| - |Z_2| \leq |Z_1 - Z_2|$  බව පෙන්වන්න.

$|Z_1 + Z_2| \leq |Z_1| + |Z_2|$  බව අපෝහනය කරන්න.

$|Z - i| < \frac{1}{2}$  නම්,  $\frac{1}{2} < |Z| < \frac{3}{2}$  බව පෙන්වන්න.

$|Z - i| \leq \frac{1}{2}$  හා  $\frac{\pi}{2} \leq \arg Z \leq \frac{2\pi}{3}$  සඳහා  $Z$  සංකීරණ සංඛ්‍යාව ආර්ගන්ඩ් සටහනේ නිරූපණය කරන ලක්ෂ්‍ය කුලකය අඩංගු  $R$  පෙදෙස අඳුරු කරන්න.

14)(a). පළමු ව්‍යුත්පන්නය පමණක් සලකමින්  $\frac{x^3}{x^4+27}$  හි අවම හා උපරිම අගයන් සොයන්න.

$$y = \frac{x^3}{x^4+27} \text{ හි දළ ප්‍රස්ථාරයක් අඳින්න.}$$

එ නයින්,

- I. තාත්වික සමපාත මූල දෙකක් තිබේ දැයි,
- II. තාත්වික සමපාත මූල තුනක් තිබේ දැයි,
- III. තාත්වික ප්‍රභින්න මූල දෙකක් තිබේ දැයි,
- IV. තාත්වික මූල තොතිබේ දැයි

සොයන්න ; මෙහි k තාත්වික වෙයි.

(b).  $AB = a$  හා  $BC = b (< a)$  සහිත ABCD සෘජුකෝණාස්‍රයක් සලකමු. P යනු CD මත විචලනය විය හැකි ලක්ෂ්‍යයක් යැයි ගනිමු.  $AP + PB$  හි දිග  $L(x)$  වෙයි. මෙහි  $DP = x$ .

$$L(x) = \sqrt{x^2 + b^2} + \sqrt{(a-x)^2 + b^2} \text{ බව පෙන්වන්න.}$$

$L(x)$  හි අවම දිග හා මෙම දිගට අනුරූප P හි පිහිටුම CD මත සොයන්න.

$L(x)$  හි උපරිම දිගද සොයන්න.

15(a).  $\int_0^\pi (\sin^3 x - \cos^3 x) dx = \frac{8}{3}$  බව පෙන්වන්න.

(b). කොටස් වශයෙන් අනුකලනය භාවිතයෙන් හෝ වෙනත් අයුරකින් හෝ  $\int x^3 \tan^{-1} x dx$  සොයන්න.

(c). හින්ත භාග යොදාගනිමින්  $\int \frac{2x^2-3}{(x-2)^2(x^2+1)}$  සොයන්න.

16(a). සමාන්තර නොවන  $l_1 \equiv a_1x + b_1y + c_1 = 0$  හා  $l_2 \equiv a_2x + b_2y + c_2 = 0$  යන සරල රේඛා අතර කෝණ සමවිච්ඡේදකවල සමීකරණ සොයන්න.

$2x - 11y - 10 = 0$  හා  $10x + 5y - 2 = 0$  මගින් දෙනු ලබන සරල රේඛා දෙක අතර සුළු කෝණයේ සමවිච්ඡේදකය ,  $4x - 7y - 8 = 0$  හා  $8x + y - 4 = 0$  මගින් දෙනු ලබන සරල රේඛා දෙක අතර මහා කෝණයේ සමවිච්ඡේදකයම බව පෙන්වන්න.

(b). g හා f හි සියලු අගයන් සඳහා  $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy - r^2 = 0$  වෘත්තය  $x^2 + y^2 - r^2 = 0$  වෘත්තයේ පරිධිය සමවිච්ඡේදනය කරන බව පෙන්වන්න.

$y + 5 = 0$  සුලු රේඛාව ස්පර්ශ කරමින් හා  $x^2 + y^2 - 4 = 0$  වෘත්තයේ පරිධිය සමවිච්ඡේදනය කරමින් (1,1) ඔස්සේ වෘත්ත දෙකක් ඇඳිය හැකි බව පෙන්වන්න.

මෙම වෘත්ත දෙකෙහි සමීකරණ සොයන්න.

17(a). ABC ත්‍රිකෝණයක් සඳහා සුපුරුදු අංකනයෙන්,

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \text{ බව සාධනය කරන්න.}$$

$a = (b - c) \cos \frac{A}{2} \operatorname{cosec} \frac{B-C}{2}$  බව අපෝහනය කරන්න.

(b).  $\theta$  හි ඕනෑම තාත්වික අගයක් සඳහා  $\tan \theta - 2 \tan \left( \theta - \frac{\pi}{4} \right)$  ප්‍රකාශනයට -7 හා -1 අතර කිසිම අගයක් ගත නොහැකි බව පෙන්වන්න.

(c).  $5 \cos^2 \theta + 18 \cos \theta \sin \theta + 29 \sin^2 \theta$  යන්න,  $a + b \cos(2\theta + \alpha)$  ආකාරයට ප්‍රකාශ කරන්න. මෙහි  $a$  හා  $b$  යනු නියත වන අතර  $\alpha$  යනු  $\theta$  වලින් ස්වායක්ත කෝණයක් වෙයි.

එනමින් හෝ වෙනත් අයුරකින් හෝ,

$8(\cos x + \sin x)^2 + 2(\cos x + 5 \sin x)^2 = 19$  සමීකරණයේ සාධාරණ විසඳුම සොයන්න.

